



Density-independent Dynamics in Discrete Time - R script

A population in which birth and death rates are constant grows independently of its own density. This situation is usually related to the absence of restriction on growth, when resources are unlimited, but it can also be associated with a depletion of resources and the extinction of the population.

Growth Rate

Let us now imagine a hypothetical population with constant growth and death rates and no migrations. At each time cycle related to a generation (T), the population size is the result of the number of individuals from the previous generation plus number of births (B), less deaths (D).

$$N_{T+1} = N_T + B - D$$

We can relate the number of deaths and births to a per capita value:

- $B = bN_T$
- $D = dN_T$

where: b = birth rate per capita for each generation; d = mortality rate per capita for each generation. Note that the rate does not change with population size, however, the number of births and deaths is proportional to population size. Let's just clarify one more premise, for didactic purposes: births and mortalities occur simultaneously in the population (eg, an annual plant). Since T is the scale of a generation, we can then say that:

- $N_{T+1} = N_T + bN_T - dN_T$
- $N_{T+1} = N_T + (b-d)N_T$

if: $r_T = b-d$; discrete growth factor

- $N_{T+1} = (1+r_T)N_T$
- $\frac{N_{T+1}}{N_T} = 1+r_T$

Since $1+r_T$ is a constant, let's designate it as λ , a positive number that measures the proportional increase in population from one generation to the next. Therefore:

- $\lambda = \frac{N_{T+1}}{N_T}$, or:

$$N_{T+1} = \lambda N_T$$

Projetando a População

Podemos então projetar a nossa população a cada ciclo de tempo (gerações). Por exemplo:

Se uma população com 100 indivíduos tem uma taxa per capita de natalidade de 0,8/ano e de mortalidade de 0,75/ano, qual o tamanho esperado da população no próximo ano?

```
N0=100
lamb=1+(0.8-0.75)
Nt1=N0*lamb
Nt1
```

Podemos também projetar a população para outras gerações, usando iterações:

```
(Nt2=Nt1*lamb)
(Nt3=Nt2*lamb)
(Nt4=Nt3*lamb)
```

Note que:

- $N_{T4} = N_{T0} \lambda \lambda \lambda \lambda$
- $N_{T4} = N_{T0} \lambda^4$

Essa equação recursiva pode ser escrita como:

$$N_T = \lambda^T N_0$$

Vamos pegar nosso exemplo anterior e projetá-lo para 10 ciclos de tempo.

```
N0=100
lamb=1+(0.8-0.75)
tmax=10
tseq=0:tmax
Nseq=N0*lamb^tseq
Nseq
plot(tseq, Nseq, type="l")
```

Tamanho Inicial

Vamos agora explorar o tamanho inicial da população.

- $N_0 = 10, 20, 30, 40$
- $\lambda = 1,5$
- $\text{tempo} = 1:10$

```
tseq=0:10
lamb=1.5
```

```

N0=c(10,20,30,40)
N0.mat=matrix(N0, ncol=length(tseq), nrow=length(N0))
N0.mat
lamb_t=lamb^tseq
lambt_mat=matrix(lamb_t,ncol=length(tseq), nrow=length(N0), byrow=TRUE)
Nt=N0.mat*lambt_mat
colnames(Nt)<-paste("t", 0:10, sep=" ")
rownames(Nt)<-paste("N0", c(10,20,30,40), sep="_")
Nt
matplot(0:10,t(Nt))

```

Vamos agora colocar o mesmo gráfico em uma escala logarítmica para o eixo y.

```

par(mfrow=c(1,2))
matplot(0:10,t(Nt))
matplot(0:10, t(Nt), log="y")

```

O que está acontecendo?? Parece que todas as populações crescem igualmente quando estamos em uma escala logarítmica! Vamos investigar a equação que estamos usando, $N_t = \lambda^T N_0$ e tirar o log dos dois lados da equação:

- $\log\{N_t\} = \log\{\lambda^T N_0\}$
- $\log\{N_t\} = (\log\{\lambda\}) T + \log\{N_0\}$


Essa equação lembra uma equação da reta $y=ax+b$, onde o intercepto é $\log(N_0)$ e a inclinação é igual a $\log\{\lambda\}$.

Desafio

- Demonstre graficamente que a inclinação das populações do exemplo acima são iguais a $\log\{\lambda\}$.

Média do Crescimento Populacional

✖ Vamos agora investigar os dados do tamanho populacional de uma espécie de pardal norte-americano (*Melospiza melodia*) partindo da premissa que essa população cresce em tempo discreto, já que os nascimentos ocorrem em um intervalo curto de tempo de nidificação a cada ano.



Vamos calcular os λ para os cinco primeiros intervalos:

```

pardal<-read.table("pardal.txt", header=TRUE, sep="\t", as.is=TRUE)
str(pardal)

```

```
head(pardal)
pardal6= pardal[1:6,]
plot(pardal6$Count ~pardal6$Year)
lamb_pardal=pardal6$Count[2:6]/pardal6$Count[1:5]
lamb_pardal
```

Agora, vamos calcular a projeção da população pela média aritmética e geométrica dos λ e desenhar as projeções junto com os dados observados!

```
#media aritmetica
(lamb.art = mean(lamb_pardal))
#media geometrica
(lamb.geo = prod(lamb_pardal)^(1/5))
tseq=0:5
plot(tseq, pardal6$Count, pch=19)
N0=pardal6$Count[1]
lines(tseq, N0*lamb.art^tseq, lty=2, col="red")
lines(tseq, N0*lamb.geo^tseq, lty=3, col="blue")
```

- Qual das duas médias parece se ajustar melhor aos dados observados? Por quê?

Crescimento Discreto

Abaixo tem o código de uma função base para a projeção do crescimento de uma população, que pode ser usada como estrutura básica para outras funções que iremos desenvolver no curso. No caso, é uma função com 3 argumentos: número de indivíduos no tempo 0 (N_0), taxa de crescimento populacional (λ) e o tempo máximo (t_{max}) de projeção da população.

```
cresc.geom= function(N0=100, lamb=1.04, tmax=10)
{
  resulta <- rep(NA,tmax)
  resulta[1] <- N0
  for (i in 2:tmax)
  {
    tam=resulta[i-1]*lamb
    resulta[i]=tam
  }
  return(resulta)
}
```

Ao copiar esse código na área de trabalho do R, um novo objeto é criado, de nome *cresc.geom*. Ele é um objeto da classe função que você pode usá-lo digitando o seu nome e especificando seus argumentos, como no exemplo a seguir:

```
resultado <- cresc.geom(N0=10, lamb=0.98, tmax=100)
```

Note que o resultado da função, nesse caso, será guardado no objeto *resultado*. Para fazer um gráfico dos resultados pode utilizar o código abaixo:

```
plot(1:length(resultado), resultado)
```

Estocasticidade Ambiental

Flutuações ambientais podem exercer efeito na taxa de crescimento instantâneo da população. De uma forma simples, podemos imaginar que essa variação funcione como um ruído no r , como se a população em média tivesse uma taxa, mas a cada realização ela pudesse ser um tanto diferente devido a condições externas a ela própria. A implementação dessa estocasticidade ambiental em modelos contínuos é um pouco mais complicada, mas podemos imaginá-la como realizações em algum intervalo pequeno de tempo. Para um crescimento discreto a construção de simulações com estocasticidade ambiental é mais intuitivo: a cada realização o λ é afetado pela variação ambiental. Vamos fazê-la.

```
npop=10
n0=10
lamb.med = 1.2
lamb.sd= 0.4
lamb = rnorm(npop, mean=lamb.med, sd=lamb.sd)
N0=rep(n0, npop)
N1=lamb*N0
lamb=rnorm(npop, mean=lamb.med, sd=lamb.sd)
N2=N1*lamb
N3=N2*rnorm(npop, mean=lamb.med, sd=lamb.sd)
N4=N3*rnorm(10, mean=lamb.med, sd=lamb.sd)
N5=N4*rnorm(10, mean=lamb.med, sd=lamb.sd)
Nt<-rbind(N0, N1, N2, N3, N4, N5)
matplot(0:5, Nt, type="l", lty=2:7)
```

Desafio

É possível adaptar a nossa função anterior de crescimento discreto para que possa também modelar populações com estocasticidade ambiental!

Dicas

O primeiro passo sempre é pensar quais argumentos vamos precisar. Nesse caso, temos apenas mais um argumento o ***lamb.dp***: o desvio padrão de *lambda*. O resto continua o mesmo, lembre-se que se o ***lamb.dp*** for 0, nossa população é determinística! Ou seja, a mesma função pode se prestar para simular ambos cenários.

R, uma população, crescimento exponencial, tempo discreto, tempo contínuo, estocasticidade ambiental

Last
update: en:ecovirt:roteiro:den_ind:di_tdr_passo http://ecovirtual.ib.usp.br/doku.php?id=en:ecovirt:roteiro:den_ind:di_tdr_passo&rev=1663260245
2022/09/15 13:44

From:

<http://ecovirtual.ib.usp.br/> -

Permanent link:

http://ecovirtual.ib.usp.br/doku.php?id=en:ecovirt:roteiro:den_ind:di_tdr_passo&rev=1663260245



Last update: **2022/09/15 13:44**